

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 6-7 100-2002

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Tél. 60-95-87 et 60-94-91 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 118 de Juillet 1970

2 Juillet 1970

page 21

V I G N E

MILDIOU (toutes régions) - Dans les secteurs où la maladie est présente, renouveler les traitements après chaque précipitation abondante.

BLACK-ROT (zones contaminées) - Les derniers traitements ont dû en général encadrer la floraison. Dans les parcelles les plus tardives, un traitement devra être appliqué le plus tôt possible après la floraison.

Attention ! la maladie est présente en abondance dans les vignes abandonnées.

VERS DE LA GRAPPE - Le second vol sera probablement court et intense. Il a déjà débuté dans les régions chaudes de la Circonscription. Un premier traitement devra être appliqué aux dates suivantes:

Produits préventifs: avant le 6 juillet
Produits curatifs: 10 au 13 juillet
régions: 122, 124, 131, 132, 133, 134, 141,
142, et 152.

Produits préventifs: 7 au 10 juillet
Produits curatifs: 11 au 15 juillet
régions 12, 24, 101, 103, 121, 123, 125, 129,
130, 143 et 151.

Dans les autres régions, attendre un avis ultérieur.

BOTRYTIS (pourriture grise) - Un premier traitement peut être prévu dès que les grains auront atteint 4 à 5mm de diamètre afin de protéger la râfle sur laquelle se produisent les premières attaques souvent inaperçues.

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE sur pommier, poirier et noyer - En dehors des plantations où certains orages ont nécessité une modification de la cadence des traitements, une application insecticide devra être effectuée entre le 5 et le 8 juillet dans les régions suivantes: 9, 22, 41, 46, 52, 101, 102, 119 (Ain et Isère), 121 (Drôme et Isère), 125, 129, 130, 143 et 145.

Dans les régions non encore concernées par les bulletins précédents, attendre un avis ultérieur.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - Le premier traitement contre la 2ème génération de vers devra être étendu entre le 6 et le 10 juillet à toute la zone de culture du pêcher.

Dans les régions concernées par le bulletin précédent, les traitements seront renouvelés à intervalle moyen de 12 jours, ou moins en cas de très forte précipitations.

MOUCHE MEDITERRANEE DES FRUITS (basse vallée du Rhône et zones suburbaines principalement)-

En raison des conditions presque constamment favorables à l'insecte depuis le 25 mai, il sera prudent d'installer les gobe-mouches dès la mi-juillet afin de repérer les premières sorties d'insectes, qui pourraient devenir plus nombreuses à partir d'août pour peu que les températures restent élevées en juillet.

INFORMATIONS

ATTENTION AUX TACHES SUR LES ABRICOTS

La Station de Pathologie Végétale de l'Institut National de la Recherche Agronomique d'Avignon-Montfavet communique:

Diverses maladies cryptogamiques provoquent des taches sur les abricots, l'Oïdium, le Corynéum, le Mildiou, le Monilia. La lutte contre ces maladies relève de traitements

790

anticryptogamiques. Il est par contre des maladies à virus qui produisent des anomalies graves sur les fruits et contre lesquelles il n'existe aucun traitement.

L'une de ces maladies, la Variole ou Sharka attaque l'Abricotier aussi bien que le Prunier. Apparue il y a quarante ans en Bulgarie, elle a progressé vers l'Ouest et le Nord, atteignant successivement la Yougoslavie, la Pologne, l'Allemagne et la Suisse. Il est à craindre malheureusement qu'elle se manifeste dans nos régions, car elle est disséminée par des pucerons.

Les symptômes sont caractéristiques:

Sur le fruit on distingue des anneaux déprimés pâles de un à deux centimètres de diamètre. Le fruit peut prendre un aspect bosselé. Il peut aussi y avoir des anneaux nécrosés rouge brun.

Sur le noyau ce sont des anneaux blancs nettement distincts du fond brun et sur les feuilles, des anneaux ou des lignes vert-pâle à contour irrégulier et à limites diffuses.

Pour limiter les épidémies il serait extrêmement intéressant de connaître les premiers foyers dès leur apparition. C'est pourquoi en cette période de récolte, les producteurs doivent prêter attention aux anomalies qui pourraient se manifester sur les fruits et ne pas inconsidérément les attribuer à des accidents climatiques ou à des défauts de traitements.

En cas de doute, ils auront intérêt à transmettre un échantillon à la Station de Pathologie Végétale du Sud-Est (Domaine St Maurice, -84- Montfavet).

CULTURES DIVERSES

MILDIU DE LA POMME DE TERRE ET DE LA TOMATE - ALTERNARIA DE LA TOMATE - Un premier traitement fongicide devra être appliqué sur pomme de terre dès réception dans le nord des départements de la Loire et du Rhône jusqu'à 400m. d'altitude (au nord de la ligne Balbigny-Villefranche) ainsi que dans la Drôme et l'Ardèche jusqu'à 600m.

Dans la zone de la tomate de conserverie (Drôme) le premier traitement devra être renouvelé après la prochaine précipitation importante.

PYRALE DU MAIS - Les conseils du bulletin précédent restent valables.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A. PITHIUD

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P. LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L. BOUYX